

CONYZA-SOORTEN

Sleutel.

1. Bloemhoofdjes dicht behaard > 2

1. Bloemhoofdjes vrijwel kaal, mogelijk enkele haren > 4

2. * Bloemhoofdjes smal ... tot 4 mm breed = ***Conyza daveauana***

2. * Bloemhoofdjes breder dan 4 mm * > 3





* = meten aan breedste hoofdjes

3. Bloemhoofdjes smal-, urnvormig 4 tot 8 mm breed, bloemwijze ruitvormig = ***Conyza sumatrensis***

3. Bloemhoofdjes bol-, eivormig 8 tot 11 mm breed, bloemwijze tuitvormig = ***Conyza bonariensis***

4. Buisbloemen met 4 lobben (loep!); omwindselbladen van uitgebloeide hoofdjes lichtbruin; planten verwisselend behaard, niet stug = ***Conyza canadensis***

4. Buisbloemen met 5 lobben (loep!); omwindselbladen van uitgebloeide hoofdjes diep donkerbruin; planten altijd stug behaard = ***Conyza bilbaoana***

Groep 1			Groep 2					
Smalle hoge fijnstraal <i>Conyza daveauana</i>	Hoge fijnstraal <i>Conyza sumatrensis</i>	Gevlamde fijnstraal <i>Conyza bonariensis</i>	Canadese fijnstraal <i>Conyza canadensis</i>	Ruige fijnstraal <i>Conyza bilbaoana</i>				
BLOEM * Bloemhoofdjes in een brede ruitvormige pluim.			* Bloemhoofdjes in een slordige tuil.					
								
Opvallend kleine bloemhoofdjes, smal cilindervormig, 2 tot 4 mm breed; meten aan breedste, volledig ontwikkelde hoofdjes. Teruggeslagen omwindselbladen van uitgebloeide hoofdje duidelijk bruiner dan <i>C. sumatrensis</i> .	Forsere bloemhoofdjes, urnvormig, 4 tot 8 mm breed; meten aan breedste, volledig ontwikkelde hoofdjes.	Forse bloemhoofdjes bol-, eivormig, 7 tot 11 mm breed. Omwindselbladen meestal rode (gevlamde) top, vandaar Gevlamde fijnstraal.	Kleine bloemhoofdjes, smal cilindervormig, 3 tot 5 mm breed. Teruggeslagen omwindselbladen van uitgebloeide hoofdje (onopvallend) licht bruin.	Kleine bloemhoofdjes, bol-urnvormig, 3 tot 5 mm breed; gemiddeld iets kleiner dan Canadese fijnstraal. Teruggeslagen omwindselbladen van uitgebloeide hoofdje diep donkerbruin en door sterke kleurcontrast met rest van de plant duidelijk in het oog springend.				
Buisbloemen (meestal) met 5 lobben (loep).			Buisbloemen (meestal) met 4 lobben (loep); lintbloemen duidelijk buiten omwindsel stekend.	Buisbloemen (meestal) met 5 lobben (loep); lintbloemen slecht ontwikkeld en niet buiten omwindsel stekend.				
Planten (donker) grijsgroen, kort en dicht (aanliggend) behaard.			Planten meest lichtgroen, ook donkerder, met lange afstaande haren, op bladrand daarnaast ook enkele zwak gekromde haren.	Planten (donker)grijsgroen met krachtige, stugge haren (vandaar Ruige fijnstraal) . Op bladrand sterk gekromde haren.				
Hoogte tot circa 150 cm.	Forse planten, gemakkelijk tot 150 cm reikend en niet zelden groter tot 250.	Hoogte tot circa 80 cm.	Hoogte tot circa 100 cm.	Hoogte tot circa 150 cm.				
Hoofdbloei: aug-okt.	Hoofdbloei: aug-dec.	Hoofdbloei: jul-okt.	Hoofdbloei: jul-sep.	Hoofdbloei: aug-sep/okt				
Deels overjarig met rozet in het najaar.			Eenjarig.	Eenjarig.	Deels overjarig met rozet in het najaar.			

*) Alle omschreven, afgebeelde bloeivormen geldt als prototype. In de praktijk komen er vele variaties voor, met vaak bossige groeiwijzen, alsook vormen die typisch zijn voor een van de andere soorten.